

**KEYTRUDA® 吉舒達®**  
(pembrolizumab) powder for injection 50 mg

## KEYTRUDA® 吉舒達® 可能的副作用有哪些？

KEYTRUDA® 吉舒達® 有可能導致嚴重的副作用，請參見“關於KEYTRUDA® 吉舒達®，我所需要知道的重要訊息？”

最常見的副作用包括：

疲倦、咳嗽、噁心、搔癢、皮疹、食慾減低、便秘、腹瀉、關節痛、呼吸短促。

如有任何副作用造成您的困擾或持續困擾您，請告訴您的醫師。以上副作用不包含KEYTRUDA® 吉舒達® 所有的可能副作用，如您需要更多訊息，請詢問您的醫師或藥師。

您可以打電話給您的醫師尋求副作用問題的相關建議。

關於KEYTRUDA® 吉舒達® 安全性和有效使用的常見資訊：KEYTRUDA® 吉舒達® 藥品有時被處方用於治療非核准適應症，如您想了解更多資訊，請詢問您的醫師或護理人員，他(她)們有更多專業的KEYTRUDA® 吉舒達® 相關資訊。

## KEYTRUDA® 吉舒達® 的成分是什麼？

活性成分：pembrolizumab

非活性成分：L-histidine, polysorbate-80, 及sucrose，可能包含hydrochloric acid/sodium hydroxide。



美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司  
地址：台北市信義路五段106號12樓  
電話：(02)66316000

ONCO-1171020-0000 01/16

**KEYTRUDA® 吉舒達® 凍晶注射劑**  
(pembrolizumab) powder for injection 50 mg

# 藥品指引說明 (key-true-duh)



本衛教資料涉及須經醫師處方之專業資訊，須經醫護人員之專業判斷後，提供予服用KEYTRUDA® 吉舒達® (pembrolizumab) 之病患，作為教育用途或進行說明，並非廣告宣傳品，請勿任意取閱或傳遞。


如有任何疾病或醫療或藥品方面的疑問，請務必諮詢您的醫師或其他專業醫護人員，謝謝您的合作。





## 關於KEYTRUDA®吉舒達®, 我所需 要知道的重要訊息?


KEYTRUDA®吉舒達®是一個透過您自身免疫系統來治療黑色素瘤的藥物，因此它也有可能使自身免疫系統攻擊您體內的正常器官或組織，而有時這些問題會造成嚴重或致命的威脅並導致死亡。



如您有發生以下任何症狀或問題，或是症狀有惡化的情形，請立刻打電話或諮詢醫生：

### ● 肺部問題(如肺炎)，其症狀有可能包括：

- 呼吸短促
- 胸痛
- 新的咳嗽症狀出現或是原有咳嗽症狀惡化



### ● 腸道問題(如結腸炎)可能導致腸道穿孔，其症狀可能包括：

- 腹瀉或較平常更頻繁的排便
- 糞便呈黑色、黏稠、或含有血液或黏液
- 嚴重胃(腹)部疼痛或一碰就痛




### ● 肝臟問題(如肝炎)，其症狀可能包括：

- 皮膚或眼白變黃
- 噁心或嘔吐
- 右上腹部疼痛
- 尿液呈現深色
- 較平時不易覺得餓
- 比平時容易出血或瘀青



### ● 荷爾蒙腺體異常(特別是甲狀腺、腦下垂體、腎上腺和胰腺)，荷爾蒙腺體無法正常運作的症狀可能包括：

- 心跳加速
- 體重變輕或變重
- 盜汗或冷汗
- 易感覺飢餓或口渴
- 排尿次數比往常多
- 掉髮
- 易覺得冷
- 便秘
- 聲音變得較為低沉
- 肌肉痛
- 頭暈或昏厥
- 持續性頭痛或不尋常的頭痛



**KEYTRUDA® 吉舒達®**  
(pembrolizumab) powder for injection 50 mg



● 腎臟問題，包括腎炎和腎衰竭，其症狀可能包括：

- 尿液量或尿液顏色的改變



● 其他器官出現異常，其症狀可能包括：

- 皮疹
- 視力不尋常改變
- 嚴重或持續性的肌肉痛或關節痛
- 嚴重的肌肉無力
- 紅血球少(貧血)



● 靜脈輸注反應，有時可能嚴重且危及生命，其徵兆及症狀可能包括：

- 畏寒或顫抖
- 呼吸短促或喘鳴
- 癢或紅腫
- 潮紅
- 暈眩
- 發燒
- 暈厥感



提醒您及時尋求醫療協助可避免問題的惡化


醫師在您使用KEYTRUDA®吉舒達®治療期間會確認您是否有上述這些問題，如有嚴重不良反應時，醫師可能會給予您類固醇藥物治療，並適當延後或終止您的KEYTRUDA®吉舒達®治療，以確保您的健康。



KEYTRUDA®吉舒達®是甚麼？

KEYTRUDA®吉舒達®是用來治療黑色素瘤的處方藥，當您以下三種情況皆符合時，可使用KEYTRUDA®吉舒達®治療：

- 您的黑色素瘤已經擴散或無法以手術切除(晚期黑色素瘤)
- 當您已試過 ipilimumab 治療並發現治療無效或不再有效
- 若您的腫瘤有不正常的“BRAF”基因，且您已試過 BRAF 抑制劑治療，發現治療無效或不再有效。



目前對於KEYTRUDA®吉舒達®作用於18歲以下患者是否安全或有效尚未有確切定論。  
目前對於KEYTRUDA®吉舒達®作用於B型或C型肝炎患者(包括無症狀帶原者)是否安全尚未有確切定論。

KEYTRUDA® 吉舒達®  
(pembrolizumab) powder for injection 50 mg



## 在接受KEYTRUDA®吉舒達®治療前，我應該要告訴醫師哪些事？

接受KEYTRUDA®吉舒達®治療前，請告訴您的醫師您是否有下列狀況：

- 有免疫系統問題如克隆氏症、潰瘍性結腸炎或紅斑性狼瘡
- 接受過器官移植
- 有肺部或呼吸困難問題
- 有肝臟問題
- 有其他醫療問題
- 目前懷孕或計劃懷孕：
  - KEYTRUDA®吉舒達®有可能傷害未出生的寶寶。
  - 具生育能力的女性，在治療過程中以及最後一次治療結束後至少四個月的時間皆須採取有效的避孕方式，請告知您的醫師您在此期間能使用的避孕方式。
  - 在KEYTRUDA®吉舒達®治療期間，如有懷孕請立即告知您的醫師。
- 目前正在哺乳或計劃哺乳：
  - 目前未知是否KEYTRUDA®吉舒達®會進入您的母乳。
  - 治療期間請勿哺乳。



請告訴您的醫師您目前使用的所有藥物

包括處方藥或非處方藥、維他命和任何中草藥補品。

瞭解您所使用的藥品，並列出清單。當您新增加藥品使用時，請將清單提供給您的醫師或藥師。



## 我將如何接受KEYTRUDA®吉舒達®治療？

- 您的醫師將透過靜脈點滴給予您**30分鐘**的KEYTRUDA®吉舒達®注射。
- KEYTRUDA®吉舒達®通常每**3週**注射一次。
- 您的醫師將決定您需要多少次的治療。
- 您的醫師將抽血確認您是否有副作用。
- 如您錯過任何的治療返診，請盡快聯繫您的醫師重新安排就診時間。



30分鐘點滴

一	二	三	四	五	六	日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

3週注射一次

KEYTRUDA® 吉舒達®  
(pembrolizumab) powder for injection 50 mg